

Übersicht der Anthelmintika beim Schaf (2011): Wirkstoffgruppen, Wirkstoffe und Handelspräparate sowie deren Indikationen

Wirkstoffgruppe	Wirkstoffe	Handelsnamen	Verabreichung	Firma	W ⁽¹⁾ (Tage)	Wirkungsspektrum ²					
						Magen-Darm-Würmer	Bandwürmer	große Lungenw.	kleine Lungenw.	große Leberegel	kleine Leberegel
Benzimidazole	Albendazol	Valbazen 1,9% [®] Albendazol10% [®]	Drench Drench	Elanco Animedica	10 14	● ³	●	●	○	○	○
	Febantel	Rintal [®]	Peletts	Bayer	14	● ³	-	●	-	-	-
	Fenbendazol	Panacur Susp.2,5 % [®] Panacur Boli250mg [®] Fenbentat [®]	Drench	MSD-	10	● ³	○	●	○	-	-
			Bolus Drench	Intervet Animedica	21 10	○ -	● -	○ -	- -	- -	
	Oxfendazol	Oxfenil [®]	Drench	Virbac	14	● ³	●	●	-	-	-
Triclabendazol	Fasinex [®]	Drench	Novartis	50	-	-	-	-	●	-	
Makrozyklische Laktone	Doramectin	Dectomax [®]	Injektion	Elanco	63	● ³	-	●	-	-	-
	Ivermectin	Qualimec [®]	Injektion	Elanco	42	● ³	-	●	-	-	-
	Moxidectin	Cydectin [®] orale Lösung.	Drench	Pfizer	14	● ³	-	●	-	-	-
AAD	Monepantel	Zolvix [®]	Drench	Novartis	7	●	-	-	-	-	-
Imidazothiazole	Levamisol	Levamisol 10 [®]	Injektion	CP-Pharma	14	● ³	-	●	-	-	-
		Concurat [®]	Pulver oral	Bayer	21						
		Belamisol [®]	Injektion	Belapharm	8						
		Ripercol [®]	Drench	Elanco	21						
Isochinolinpräparat	Praziquantel	Cestocur [®]	Drench	Bayer	0	-	●	-	-	-	-
Salizylsäureanilide	Closantel	Flukiver [®]	Drench	Elanco	42	● (nur blutsaugende Würmer)	-	-	-	●	-
Kombinationspräparate	Closantel+ Mebendazol	Flukiver Combi [®]	Drench	Elanco	65	● ²	●	●	-	●	-
	Moxidectin+ Triclabendazol	Cydectin TriclaMox [®]	Drench	Pfizer	31	● ²	-	●	-	●	-

Für Ziegen sind momentan **keine** Präparate zugelassen. Schafpräparate (50%ige Dosiserhöhung beachten) oder Eprinex[®] pour on von Merial (für Rind zugelassen) können nach Umwidmung angewendet werden.

Für **milchliefernde** Schafe sind nur Cydectin orale Lösung, Valbazen 1,9%[®] und Panacur Boli250mg[®] mit 5 d sowie Panacur Susp. 2,5 %[®] mit 7 d Wartezeit für die Milch zugelassen.

¹ Wartezeit für essbares Gewebe in Tagen

² Wirksamkeit gegen erwachsene Würmer:

● wirksam;

- nicht wirksam oder nicht geprüft

○ Teilwirkung oder nur in erhöhter Dosis ausreichend wirksam

●³ nur wirksam, wenn keine resistenten Wurmstämme in der Herde auftreten

Wurmkur Cydectin+Cestocur

4 Teile Cydectin (nur Rundwürmer, aber dagegen etwa 5 Wochen wirksam) von Pfizer

+

3 Teile Cestocur (nur Bandwürmer) von Bayer

von dieser Mischung werden 0,35 ml/kg Lamm gegeben

Bsp.: immer direkt vor dem Eingeben

- 4 Liter Cydectin mit 3 Liter Cestocur mischen,
- reicht für 400 Lämmer mit 50 kg

- 2 Liter Cydectin mit 1,5 Liter Cestocur mischen,
- reicht für 200 Lämmer mit 50 kg

Mischung für 10kg Lämmer: 3,5ml je Lamm

Mischung für 20kg Lämmer: 7,0ml je Lamm

Mischung für 30kg Lämmer: 10,5ml je Lamm

Mischung für 40kg Lämmer: 14,0ml je Lamm

Mischung für 50kg Lämmer: 17,5ml je Lamm